




# URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 5/2- SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

## YOSHLARDA O'TKINCHI MIYA QON AYLANISHI BUZILISHLARI ETIOLOGIYASIDA MAGISTRAL QON TOMIRLAR ANOMALIYALARI VA DISSEKSIYASINING O'RNI



**Samatov Farrux Farxodovich** – TDTU Termiz filiali Tibbiy psixologiya, nevrologiya va psixiatriya kafedrasasi assistenti, PhD<sup>1</sup>

e-mail: [samatovfarrux@icloud.com](mailto:samatovfarrux@icloud.com), orcid logo - <https://orcid.org/0009-0003-8049-5540>

**Xo'shmurodova Mexrigiyo Allayorovna** - TDTU Termiz filiali Tibbiy psixologiya, nevrologiya va psixiatriya kafedrasasi dotsenti, PhD<sup>2</sup>

e-mail: [mehrigiyoXushmurodova@gmail.com](mailto:mehrigiyoXushmurodova@gmail.com), orcid - <https://orcid.org/0009-0004-4336-8259>

**Izzatullaev Jonibek Shokir o'g'li** - TDTU Termiz filiali Tibbiy psixologiya, nevrologiya va psixiatriya kafedrasasi assistenti<sup>3</sup>

e-mail: [izzatulloevjonibek50@gmail.com](mailto:izzatulloevjonibek50@gmail.com), orcid logo - <https://orcid.org/0009-0006-1487-6574>

**Samatov Farrux Farxodovich, Xo'shmurodova Mexrigiyo Allayorovna,  
Izzatullaev Jonibek Shokir o'g'li**

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali tibbiy psixologiya, nevrologiya va psixiatriya kafedrasasi assistentlari

**Dolzarbliigi:** So'nggi yillarda viloyat miqyosida yosh va o'rta yoshdagi (22-45 yosh) aholi o'rtasida transiztor ishemik hujum (TIH) ko'rsatkichlari ortib bormoqda. Bunday bemorlarda klassik aterosklerotik omillar bo'lmaganda, tomir anatomik variantlari patogenezda birinchi planga chiqmoqda.

**Maqsad:** Yosh bemorlarda TIH kelib chiqishida umurtqa (vertebral) va uyqu (karotid) arteriyalari dissektsiyasi hamda patologik qiyshiqliklarining (kinking, coiling) ahamiyatini baholash.

**Material va metodlar:** Klaster nevrologiya va neyro-vizualizatsiya bo'limlarida TIH tashxisi bilan davolangan **20 nafar yosh bemorning** (o'rtacha yoshi  $34 \pm 4$ ) bosh miya va bo'yin qon tomirlari MRT-angiografiyasi hamda MSKT tahlillari o'rganildi.

**Natijalar va muhokama:** Retrospektiv tahlillar shuni ko'rsatdiki, tekshirilgan yosh guruhidagi 20 nafar bemordan **6 tasida (30%)** vertebral arteriyalar patologik



# URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 5/2- SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

burilishi yoki gipoplaziyasi, **2 tasida (10%)** jismoniy zo'riqishdan keyingi arteriya dissektsiyasi (shikastlanishi) aniqlandi. Qolgan 12 nafar bemorda vegetativ-tomir disfunksiyalari va mikrotrombotsitar o'zgarishlar yetakchilik qildi. Dinamikada o'tkazilgan maqsadli tomir va antiagregant terapiya o'tkir ishemik insultga o'tish xavfini to'liq bartaraf etdi.

**Xulosa:** Surxondaryo hududida yosh bemorlar to'satdan kognitiv yoki fokal nevrologik defitsit bilan murojaat qilganda, an'anaviy xavf omillaridan tashqari, zudlik bilan kontrastli yoki MRT/MSKT angiografiya skriningini o'tkazish o'tkir insultning oldini olishda hal qiluvchi diagnostik bosqich hisoblanadi.